ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

โรคราสีชมพูยางพารา - เมื่อถึงปลายฤดูฝนมักจะพบเห็นยางพาราเกิดอาการยางไหล บริเวณคาคบหรือกิ่งที่เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อราชนิดหนึ่ง เมื่อช่วงฤดูฝนโรคนี้จัดเป็นโรคที่มีความสำคัญชนิดหนึ่งเรียกว่าโรคราสีชมพู เพราะจะทำให้กิ่งของต้นยางตายไปทีละกิ่งจนหมด และสุดท้ายก็จะตายไปทั้งต้น

โรคราสีชมพู (Pink Disease)

เชื้อสาเหตุ เชื้อรา *Corticium salmonicolor*

ลักษณะอาการ

บริเวณกิ่งหรือคาคบ อาการขั้นแรกที่เชื้อราเข้าทำลายเห็นเป็นรอย น้ำยางถูกขับไหลออกมาเป็นทางยาวใต้รอยแผล เมื่อน้ำยางแห้งจะมีราดำเข้าจับ เวลาอากาศชุ่มชื้นเชื้อราจะเจริญเติบโตเต็มที่และเปลี่ยนเป็นสีชมพู มีรอยแตกระแหงเล็ก ๆ กระจายทั่วไป ส่วนของต้นยางเหนือส่วนที่เป็นโรคจะแห้งตายไป มีกิ่งอ่อนแตกเจริญขึ้นมาใหม่จากส่วนใต้รอยแผล

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค อากาศมีความชุ่มชื้น

การป้องกันกำจัด

1. ดูแลรักษาสวนยางให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่อับชื้น
2. เมื่อพบต้นที่เป็นโรค ให้รีบตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้งและทำลายเสีย
3. สำหรับต้นยางที่ยังไม่เปิดกรีด หากพบโรคนี้ให้ใช้บอร์โดมิกซ์เจอร์ ซึ่งมีอัตราส่วนของจุนสี 120 กรัม ปูนขาว 240 กรัม (ถ้าเป็นปูนเผาใหม่ใช้ประมาณ 150 กรัม) ผสมน้ำ 10 ลิตร ทา
4. สำหรับยางที่เปิดกรีดแล้ว หากเป็นโรคนี้ ให้ใช้สารเคมีเบโนมิล หรอไตรดีมอร์ฟ(Tridemorph) ฉีดพ่นหรือทาบริเวณที่เป็นโรคโดยขูดส่วนที่เป็นโรคออกก่อนฉีดหรือทา

X

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร